

Recepta



Świadczeniodawca

Pacjent

Pacjentko/Pacjencie

63022236512

PESEL

Uprawnienia
dodatkowe

Odpłatność

Rp **Leki przeciwcukrzycowe z grupy inhibitorów SGLT2 zwane flozynami**

Otrzymałaś/łeś te zalecenia, ponieważ kontynuujesz przyjmowanie leku z grupy inhibitorów SGLT2

Flozyny to doustne leki przeciwcukrzycowe. Ich działanie skutkuje wydalaniem nadmiaru glukozy z organizmu z moczem. Pomaga to w obniżeniu stężenia glukozy we krwi, a także w redukcji masy ciała.

1. Zapoznaj się z ulotką leku
2. Przyjmuj lek zgodnie z indywidualnym zaleceniem lekarza/pielęgniarki.
3. Obserwuj reakcję na lek i zgłaszaj ewentualne niepokojące objawy pracownikom opieki zdrowotnej

Flozyny to leki wysoce skuteczne i bezpieczne. Jednak, tak jak każdy lek, mogą powodować działania niepożądane. Obecność glukozy w moczu może być przyczyną jego częstszego oddawania oraz może zwiększać ryzyko wystąpienia grzybiczego zakażenia narządów płciowych zwykle o charakterze łagodnym lub umiarkowanym, poddającym się leczeniu.

Można zmniejszyć ryzyko infekcji poprzez:

- stosowanie zasad zdrowego żywienia i odpowiednie nawadnianie organizmu
- higienę okolic intymnych
- higienę wypróżniania i współżycia seksualnego
- regularne konsultacje profilaktyczne u ginekologa/położnej (pacjentki) i urologa (pacjenci)

Każdorazowo zwróć się do specjalistów:

- kiedy zauważysz pierwsze objawy zakażenia grzybiczego okolic intymnych lub infekcji dróg moczowych
- kiedy objawy nie ustępują pomimo zastosowanego leczenia lub powracają

Dla Ciebie Pacjentko/Pacjencie
od Pielęgniarki/Położnej

Rozwinięcie porad z tej recepty znajdziesz na www.dluzszezyciezukrzyca.pl

Data wystawienia:

29.10.2024



Data realizacji od dnia 29.10.2024



PC-PL-105889