

Recepta



Polska Federacja
Edukacji w Diabetologii

Świadczeniodawca

Pacjent

Pacjentko/Pacjencie

63022236512

PESEL

Uprawnienia
dodatkowe

Odpłatność

Rp **Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu.**

Otrzymałaś/łeś te zalecenia, ponieważ jesteś w procesie diagnostyki w kierunku cukrzycy lub chorujesz na cukrzycę. Zjawiskiem nieodłącznym w cukrzycy jest hiperglikemia (stężenie glukozy we krwi powyżej normy) i związana z nią obecność ciał ketonowych w moczu. Badaniem pozwalającym rozpoznać hiperglikemię i kwasicę ketonową jest wykrycie obecności glukozy i ciał ketonowych w moczu.

Jak paski używać?

- 1. Jeżeli zauważysz, że pole reakcyjne paska testowego jest przebarwione lub zaciemnione, wyrzuci pasek testowy i weź kolejny z opakowania.
- 2. Przed wykonaniem pomiaru nie dotykaj powierzchni pola reakcyjnego paska palcem lub innym przedmiotem.
- 3. Po każdorazowym wyjęciu paska testowego niezwłocznie zamknij opakowanie.
- 4. Prawidłowy mocz nie powinien zawierać glukozy i ciał ketonowych.
- 5. UWAGA! Wyjątek mogą stanowić próbki moczu z zawartością glukozy u chorych leczonych lekami z grupy inhibitorów SGLT-2 (flozyny).

Wyniki pomiarów zapisuj w dzienniczku samokontroli i weź go na kolejną wizytę

Jak paski przechowywać?

- 1. Nieużywane paski testowe przechowuj zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
- 2. Nie usuwaj środka osuszającego z opakowania.
- 3. Nigdy nie przekładaj pasków testowych do innego opakowania.
- 4. Zamknięte opakowanie z paskami przechowuj w temperaturze pokojowej.
- 5. Pudełko z paskami testowymi chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią i ciepłem. Nie przechowuj pasków w kuchni lub łazience.

Pacjentko/Pacjencie pamiętaj, że na każdej wizycie sprawdzę czy prawidłowo używasz paski diagnostyczne do oznaczania stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu.

Dla Ciebie Pacjentko/Pacjencie
od Pielęgniarki/Położnej

Data wystawienia:

17.04.2025



Data realizacji od dnia 18.04.2025



dłuższe
życie z cukrzycą

PC-PL-106438